Cabinet dentaire du Docteur BARET
Chirurgien-Dentiste à Paris
100 Rue Lamarck 75018 Paris
Tel. : +33 1 46 06 90 70
dr-baret-leslie.chirurgiens-dentistes.fr

L'éruption des dents de lait et des dents définitives

L'éruption des dents est variable d'un enfant à l'autre. La première dent de lait sort vers 6 mois et la dernière tombe vers 13 ans. Un suivi régulier permettra de surveiller leur bon développement et l'apparition des dents définitives.

ÉRUPTION DES DENTS : QUELQUES DATES POUR MIEUX VOUS Y RETROUVER



Les dents temporaires ou dents de lait sont au nombre de 20.
Les dents permanentes apparaissent entre 6 et 13 ans environ et comprennent 28 dents (32 avec les dents de sagesse).
Un suivi régulier est à prévoir afin de surveiller leur éruption et leur bon développement.

POURQUOI DES DENTS DE LAIT ?

Les dents définitives n'auraient pas la place de se développer dans la mâchoire d'un bébé ; c'est pour cela que l'on a deux dentitions successives.

Il est important de prendre soin de ces dents de lait car c'est de leur santé que dépendra le bon développement futur des mâchoires et des dents.

- Les dents du jeune enfant peuvent être attaquées par des caries à la suite d'excès de confiseries, de boissons sucrées... Ces caries sont rarement douloureuses mais, si elles ne sont pas soignées, elles peuvent entraîner des répercussions sur le long terme.
- Une alimentation équilibrée limitera les sucres, sources de gros dégâts.
- Si nécessaire, des traitements spécifiques existent pour la prévention des caries sur les dents des enfants.

Dès l'arrivée des dents de lait, de bons gestes de brossage doivent être effectués ; d'abord par les parents, puis par les enfants qui vont mimer les gestes de leurs parents.

Si des dents tardent à faire leur apparition ou à tomber, n'hésitez pas à nous en faire part.

Des radiographies peuvent être réalisées pour contrôler la présence des germes de toutes les dents.

À SAVOIR

Quand les dents définitives sont présentes, le brossage doit être parfaitement maîtrisé par l'enfant.

En effet, elles sont particulièrement sensibles aux caries pendant les quelques années qui suivent leur éruption.